

N° d'ordre

UNIVERSITÉ D'ALGER

INSTITUT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
EN SCIENCES MÉDICALES

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

Thèse pour le Diplôme de Docteur en Sciences Médicales

TRAITEMENT  
DES GRANDES EVENTRATIONS  
DE LA PAROI ABDOMINALE  
PAR TULLE DE DACRON  
INTRA-PERITONEAL

Soutenue par :

**Le Docteur BELHOCINE Madjid**

Maitre Assistant en Chirurgie Générale

**DIRECTEUR DE THÈSE**

**Professeur M. ZITOUNI**

ALGER. LE .....

## SOMMAIRE

---

### AVANT PROPOS

I) INTRODUCTION :	P.3
A) DEFINITION	
B) HISTORIQUE	
C) PRINCIPALES TECHNIQUES CHIRURGICALES	
D) OBJECTIFS	
II) RAPPELS :	P.17
A) ANATOMIE CHIRURGICALE DE L'ESPACE INTRA-PERITONEAL RETRO-PARIETAL (EIPRF)	
B) BASES PHYSIOLOGIQUES	
C) BASES PHYSIOPATHOLOGIQUES	
III) MATERIEL ET METHODE :	P.35
A) NOS PATIENTS	
B) DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES	
C) ETIOLOGIE	
D) EXPRESSION CLINIQUE	P.40
E) ANATOMIE PATHOLOGIQUE	
F) TRAITEMENT	P.58
G) RESULTATS	P.76
IV) DISCUSSION :	P.89
A) NOS PATIENTS	
B) PREPARATION ABDOMINALE	
C) METHODE	
D) RESULTATS	P.99
1 - MORTALITE	
2 - INCIDENTS OBSERVES	
3 - RECIDIVES	
4 - COMMENTAIRES	
E) INDICATIONS	P.109
F) ATTITUDE PREVENTIVE	P.116
CONCLUSION	P.128
BIBLIOGRAPHIE	P.131
ANNEXE (OBSERVATIONS)	P.146

**Résumé :** Les éventrations post-opératoires de la paroi abdominale restent fréquentes.

Le traitement chirurgical des grandes éventrations fait appel aux prothèses synthétiques. Le traitement des grandes éventrations par prothèse intra-péritonéale est une technique peu utilisée.

Nous rapportons une série de 86 patients opérés pour éventration par prothèse intra-péritonéale sur une période de trois ans. La technique utilisée est inspirée du procédé décrit par bourgeon que nous avons modifié.

La technique est décrite de façon détaillée.

Les résultats sont satisfaisants.

— Mortalité : 1,14 % — Morbidité acceptable — Récidives ; 2,3 %.

Les résultats sont comparés aux données de la littérature internationale.

---

**DISCIPLINE :** Chirurgie générale.

---

**MOTS CLÉS :**

- Eventrations post-opératoires.
- Traitement chirurgical.
- Prothèse intra-péritonéale.
- Reintervention après prothèse intra-péritonéale.
- Prévention des éventrations.

---

**Directeur de thèse :**

**Professeur Messaoud ZITOUNI**  
Clinique de Chirurgie Générale  
H. C. A. Alger

---

Adresse de l'auteur  
90 Villa AMRAOUA  
TIZI-OUZOU

**Adresse du Service**  
Service de Chirurgie  
Générale . C.H. U.  
NEDIR M, Tizi-Ouzou

---